



Hygieneplan für Nagelstudios

Art	Produkt	Menge & Einwirkzeit	Anwendung	Häufigkeit	Wer?
Hygienische Händedesinfektion 	Kodan oder Sterillium Classic Pur Händedesinfektion	Vollständige Benetzung 30 Sekunden	Desinfektionsmittel auf trockene Hände geben. Gründlich über die Hände verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalz zu beachten.	Vor und nach Kundenkontakt. Nach Kontakt mit kontaminierten Materialien / Gegenständen und Flächen.	Katja Elias
Rotierende Instrumente 	Rotasept Ultraschallreiniger	6 Minute	Instrumente in den Ultraschallreiniger mit unverdünnter Lösung einlegen. Instrumente müssen vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Nach Ablauf der Reinigungszeit auf Papiertuch abtrocknen lassen.	Direkt nach der Modellage	Katja Elias
Instrumente 	Rotasept Ultraschallreiniger	6 Minuten	Instrumente in den Ultraschallreiniger mit unverdünnter Lösung einlegen. Instrumente müssen vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Nach Ablauf der Einwirkungszeit auf Papiertuch abtrocknen lassen	Direkt nach der Modellage	Katja Elias
Waschbecken, Fußboden, Flächen 	Sagrotan Universal Reiniger	2 Kappen (60ml) in 5 Liter Wasser 15 Minuten	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Nach Ablauf der Einwirkungszeit mit Einmaltuch nachwischen.	Täglich oder nach Kontamination.	Katja Elias
Flächen, Behandlungsbereich 	Mikrozyd Schnell- & Sprühdesinfektion	5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nach Ablauf der Einwirkungszeit mit Einmaltuch nachwischen.	Nach Kundenwechsel.	Katja Elias
Händewaschung 	Sagrotan No Touch Im elektrischen Spender	1 Portion 15 Sekunden	Waschlotion aus Direktspender in die Hände geben und gut mechanisch reinigen. Dann gründlich abspülen. Anschließend Einmalhandtücher verwenden.	Vor Arbeitsbeginn und nach Arbeitsende. Nach Toilettenbenutzung. Bei sichtbarer Verschmutzung.	Katja Elias
Weitere Hygienemaßnahmen 	Handschuhe, Mundschutz		Vor dem Anlegen und nach dem Ablegen der Handschuhe sind die Hände zu desinfizieren. Ein Handschuhwechsel ist bei Beschädigung des Handschuhs und zwischen der Behandlung der Kunden notwendig. Mundschutz: Wechsel mind. 1x täglich.	Handschuhe müssen immer getragen werden, wenn es zum Kontakt mit Körperflüssigkeiten oder Desinfektionsmittel kommen kann.	Katja Elias

Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten!

Bei Umgang mit den Desinfektionsmitteln immer Schutzhandschuhe tragen (außer Händedesinfektion).